Plantes nouvelles ou critiques des serres du Muséum

par M. A. Guillaumin.

67. × *Gastrolea* et × *Gasteraloe*.

Par raison de priorité, le nom de × *Gasteraloe* Guillaumin (avril 1931) doit être remplacé par *Gastrolea* Walther (septembre 1930) mais dans la liste que ce dernier a donnée (*Journal of the Cactus and Succulents Society of America* II, p. 307, 1930) il y a lieu d'ajouter :

× Gastrolea Lapaixii Guillaum. nom. nov. = × *Gasteraloe Lapaixii* Guillaum. = *Aloe Lapaixii* Radl. (*Gasteria acinacifolia* × *Aloe striata*).

× G. Pfrimmeri Guillaum. nom. nov. = × *Gasteraloe Pfrimmeri* Guillaum. (*Gasteria sp.* § *Parvifoliæ* × *Aloe variegata*?).

× G. Simoniana Guillaum. nom. nov. = × *Gasteraloe Simoniana* Guillaum. = *Aloe Simoniana* Deleuil (*Aloe aristata* × *Gasteria disticha*).

68. Hybrides nouveaux de *Phalænopsis* obtenus par feu Liouville.

P. Esmeralda Reichb. f. × *Hebe* Rolfe [*Esmeralda* × (*Sanderiana* × *rosea*)].

Se rapproche beaucoup du *P. Esmeralda* mais les sépales et les pétales sont à peine rejetés en arrière, les sépales latéraux sont plus larges et le lobe médian du labelle est plus court et plus obtus.

Les sépales et les pétales sont violet améthyste, plus foncés au centre, les bords inférieurs des sépales étant presque libres, le labelle est violet clair avec raies violet foncé se fondant dans une teinte uniforme violet très foncé sur les bords postérieurs des lobes latéraux et à l'extrémité antérieure du lobe médian.

P. × *leucorrhoda* Reichb. f. var. *Cynthia* Veitch × *amabilis* Bl. × *Stuartiana* Reichb. f.

Sépale supérieur uniformément très légèrement verdâtre, sépales latéraux à moitié supérieure blanche et moitié inférieure jaune verdâtre ponctué de rouge, pétales blancs, labelle ayant la forme de celui de *P.* × *Ariadne* Rolfe (*Aphrodite* × *Stuartiana*), à lobe médian jaune verdâtre ponctué de rouge à la base et lobes latéraux blancs marqués de rouge dans la moitié basilaire, des raies

étant en arrière et des points en avant avec un peu de jaune sur le bord en avant.

P. Lindenii Loher × *Sanderiana* Reichb. f. × *amabilis* Bl. Sépales très légèrement jaune verdâtre, les latéraux tachés de carmin dans leur moitié interne sur les 3/4 de la largeur, pétales avec une très légère transparence rose, labelle à lobes latéraux analogues à ceux de *P. amabilis* mais plus rayés de rose en arrière et tachés de rose en avant vers la base, bord antérieur teinté de jaune terne verdâtre, lobe médian panduriforme, teinté de jaune verdâtre dans les angles et de rose vers la base, cirrhes analogues à ceux du *P. Sanderiana*.

69. *Epiphyllum truncatum* Haw. var. **Wagneri** Rol.-Goss. mss.

Diffère du type par les articles uniformément violet sombre, l'ovaire sans aucune écaille vers le sommet, les pièces externes du périanthe rouge brique à peine plus claires au centre, les pièces internes rouge brique à centre blanc rosé et base violet vif, le style nettement plus long que les étamines.

Argentine : Grand Chaco (*Wagner*, f. 104, 1902).